



МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасные и ядовитые растения вокруг нас

Совсем скоро начнутся летние каникулы - время общения с природой. Чтобы общение с растительным миром не омрачилось нежелательными последствиями, познакомьтесь с растениями, которые лучше обходить стороной.

ВОРОНИЙ ГЛАЗ



Ягода легко узнаваема по четверем (иногда бывает пять или шесть) широким овальным листьям, в середине которых «восседает» ядовитый плод синего цвета. Цветение начинается в конце весны. Растение чаще всего располагается в тени. Опасность таят и сами листья, которые могут негативно воздействовать на организм.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО



У этой ягоды есть и другие названия, например, Волчий плющ, Волчья ягода или Волчегодник обыкновенный. Волчье лыко представляет собой одиночный кустарник, цветы которого похожи на сирень. Его запах вызвать головную боль, а иногда и вызвать кашель, чихание и даже насморк. Плоды — красные, вытянутой формы. Трогать растение нельзя. Возможно появление волдырей и язв. Цветет в апреле и мае.

КУПЕНА ДУШИСТАЯ



Небольшое растение около 65 сантиметров в высоту с шарообразными синечерными или красными ягодами, заостренными листьями и белыми поникшими цветами. Симптомы отравления с расстройством желудочно-кишечного тракта, головными болями и одышкой могут появиться даже при соприкосновении. Растет в сухих хвойных и березовых лесах, а также на лугах, опушках и степных территориях.

ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ



Цветок ландыша имеет ядовитые плоды красного или оранжевого цвета. Созревание проходит с августа по сентябрь. Употребление ягод ландыша способствует появлению судорог, тошноты, головокружения, а также возможно нарушение сердечной деятельности.


В медицине плоды используются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

БЕРЕСКЛЕТ



Кустарник, который может достигать в высоту до двух метров, часто используется как декоративный на дачных участках. Для птиц ягода в виде красноватой коробочки грушевидной формы не представляет опасности, зато может негативно повлиять на работу человеческого организма. Плодоносит в августе и сентябре.

КРУШИНА ЛОМКАЯ



Черные костяные плоды крушины облюбовали местные водоемы. Созревание приходится на конец августа. Ягода при употреблении в свежем виде провоцирует сильную рвоту.

ЛЕСНАЯ ЖИМОЛОСТЬ



Лесная жимолость имеет ярко-красные ягоды, которые напоминают красную смородину. Они токсичны, поэтому лучше обходить их стороной.

ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ



Эти овальные ягоды цветут с мая по конец августа в дубовых лесах, в сырых оврагах и возле водоемов. Ядовиты не только плоды, но и сам кустарник, который к тому же имеет крайне неприятный запах.

ПАСЛЕН ЧЕРНЫЙ



Круглые ягоды черного цвета, имеющие черно-фиолетовую мякоть, ядовиты только в недозревшем виде. В этот период растение источает неприятный запах. Зрелые плоды есть можно — они богаты витамином С. Из них часто делают варенье. Отметим, что ягоды содержат трудновыводимые красящие вещества. Произрастает паслен как в лесу, так возле водоемов, оврагов и обочин.

БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТНЫЙ



Крупные чашеобразные околоцветники переходят в грозди красных ягод. Токсичность распространяется на плоды, стебель, листья и даже корневище. Растет на заболоченных территориях, отсюда и появилось название.

АРОННИК ПЯТНИСТЫЙ



Растение представляет собой гроздья плотных красных ягод, которые появляются на стеблях после того, как слетели листья. При употреблении плодов возможен летальный исход.

ТИС ЯГОДНЫЙ



Другие названия: зеленица, негниючка, негной, красное дерево. Дерево часто используется при создании декоративных живых изгородей. За красотой кроется токсичность — плоды, побеги, кора и древесина ядовиты. В древности тис считался деревом смерти.

ВОРОНЕЦ КОЛОСИСТЫЙ



Крупные продолговатые плоды воронца могут быть черного, красного и даже белого цвета. Растение опасно не только при приеме внутрь, но при просто соприкосновении. После касания могут возникнуть сильное воспаление и волдыри.

БОРЩЕВИК



Растение вызывает сильнейшие аллергические буллёзные дерматиты, так называемые «ожоги» (вплоть до летальных случаев).

ЯСЕНЕЦ



В народе - огонь-травка или неопалимая купина. Прикосновение к живому растению во время цветения через несколько часов вызывает ожог с образованием пузырей. Пузыри через несколько дней лопаются, оставляя на коже болезненные ранки. Которые могут заживать несколько месяцев, состояние ран ухудшается каждый раз, когда на них светит солнце.